

PROVFISKE 2013


FÄRNEBOFJÄRDENS FVOF

Sammanställt av Erik Stål, Färnebofjärdens FVOF


OMFATTNING

- FÄRNEBOFJÄRDEN DEL 1
 - 32 BOTTENNÄT
 - 3 PELAGISKT NÄT (0-18 METER)
- FÄRNEBOFJÄRDEN DEL 2
 - 40 BOTTENNÄT


Längd Abborre




Längd Gös




Jämförelser utvalda arter (antal)




Jämförelser utvalda arter (vikt (Ab+gös är i hg. Övriga i gram))




Totalt fångstantal i Färnebofjärden




Total fångstvikt (kg) i Färnebofjärden




Fångstvikt i Färnebofjärden 2013




Fångstvikt i Färnebofjärden 2005



Fångstvikt Färnebofjärden 1999




Andel Pred (Ab, Gä, Gös) och cyprinider




Sammanfattande 2013

Längd (mm) ^a	668552		
	155740		
	20130708		
	Medel	Störst	Minst
Abborre	142,65	400	3
Benlöja	110,30	160	6
Björkna	133,52	330	6
Braxen	185,68	385	8
Faren	130,00	150	10
Gers	60,32	140	3
Gädda	703,75	880	46
Gös	289,60	670	6
Mört	113,70	250	3
Nors	81,85	125	4
Sik	185,83	305	13
Siklöja	140,00	140	14
Simpa (-or)	84,75	97	7

Procentuell fördelning av vikt gös, gädda och abborre



Abborre, gädda och gös i Färnebofjärden



Sammanfattning 2013

- Klassning för ekologiskt system är 0,522692 dvs statusklass 2 = god
- Arter 2013 (13 st)
 - Abborre
 - Benlöja
 - Björkna
 - Braxen
 - Faren (NY)
 - Gers
 - Gädda
 - Gös
 - Mört
 - Nors
 - Sik
 - Siklöja
 - Simpa
- Saknade arter 2013

Sammanfattning 2013

- Färre men större abborrar
- Gösen är stabil (2+ är stora)
- Sik och siklöja osäker
- Nors ökar
- Gädda ej validerbar
- Mört minskar
- Större viktandel predatorer 2013

**STORT TACK TILL ALLA
SOM MEDVERKAT TILL
ATT PROVFISKET
KUNNAT GENOMFÖRAS
2013!!!**

**PROVFISKET LEDER TILL ATT OMRÅDET HAR
GRUNDLÄGGANDE DATA FÖR ATT KUNNA UTFÖRA EN
HÅLLBAR FISKEVÅRD FÖR FRAMTIDEN.**